

3回目接種を受けられる方へ **重要**

◆これまでにアナフィラキシー(重度のアレルギー反応)を起こしたことがある方は、秩父市立病院、秩父病院、小鹿野中央病院、皆野病院のいずれかに予約をしてください。

◆帰宅後の体調不良には、接種医療機関、かかりつけ医、休日診療所、休日当番医療機関、救急病院等が対応しますので、ご安心ください。




【参考】3回目接種の有効性、副反応と交互接種について

1回目, 2回目でファイザーを接種した人の3回目接種		
種類	ファイザー(同じワクチンの接種)	モデルナ(交互接種)
接種量	1回目, 2回目と同量	1回目, 2回目の半量
発症予防有効性	91%	ファイザーと同程度
重症化予防	92%	ファイザーと同程度
入院予防	93%	ファイザーと同程度
3回目副反応	2回目と比べ同程度もしくは低い頻度	許容範囲で半数以上は軽度か中等度
抗体の増え方	20倍	31.7倍

※裏面もご覧ください。

(米国 CDC)



◆秩父郡市医師会のホームページに、地元医師会員等のワクチン接種後アンケート、副反応情報等が掲載されています。是非ご覧ください。

秩父郡市医師会ホームページ



ちちぶワクチン推進会議

秩父市 横瀬町 皆野町 長瀬町 小鹿野町 秩父郡市医師会

ファイザー社とモデルナ社のワクチン



2回目接種までで分かったこと

	ファイザー社	モデルナ社
発症予防効果	約95%	約94%
感染リスク	約90%減	約90%減
主な副反応		
50%以上に発現	注射部位の痛み、疲労、頭痛	注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉痛
10～50% //	筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ	関節痛、悪寒、吐き気・嘔吐、リンパ節症、発熱、接種部位の腫れ(モデルナアーム)、発赤・紅斑
1～10% //	吐き気、嘔吐	接種後7日目以降の接種部位の痛みなど
非常にまれに発現 アナフィラキシー	100万回接種あたり19件	100万回接種あたり16件
軽症の心筋炎、心膜炎	// 接種あたり1.4件	// 接種あたり5.0件
血小板減少症、血栓症	// 接種あたり0.2件	// 接種あたり0.1件

発熱は1回目より2回目の後の方が出やすく、

日本ではファイザー製で3%→2回目38%(医療従事者)、モデルナ製で7%→2回目78%(自衛隊員)。

心筋炎、心膜炎:10代・20代の男性では、100万人あたり、

ファイザー社のワクチンでは10代で3.7人、20代で9.6人であったのに対し、

モデルナ社のワクチンでは10代で28.8人、20代で25.7人であった。

実際に新型コロナウイルスに感染した場合、日本国内の15～39歳で100万人あたり834人(約0.08%)の発症となっている。

→10代・20代の男性は、1回目にモデルナ社でも、2回目以後はファイザー社のワクチンを接種できる。